

Infections de l'oreille moyenne chez l'enfant d'âge préscolaire

Les infections d'oreilles sont fréquentes chez les enfants d'âge préscolaire. Avoir du liquide dans l'oreille moyenne peut interférer avec l'audition normale.

Les symptômes suivants peuvent être observés:

- maux d'oreilles ou drainage d'oreilles
- tirer les oreilles
- réaction différente aux sons de la parole et de tous les jours
- volume du téléviseur ou de la radio à un niveau plus élevé que d'habitude
- changement dans les habitudes d'alimentation et de sommeil
- irritabilité
- besoin fréquent de répéter des directives et des informations

SI VOUS PENSEZ QUE VOTRE ENFANT SOUFFRE D'UNE INFECTION D'OREILLE, VEUILLEZ CONTACTER VOTRE MÉDECIN.

Voici des suggestions pratiques si votre médecin vous informe que votre enfant souffre d'une infection d'oreille:

- capter l'attention de votre enfant avant de lui donner des directives; regarder votre enfant
- parler de façon naturelle, un peu plus fort que d'habitude
- se rapprocher (pas plus qu'une distance de 5 pieds) et tenter d'être face-à-face
- réduire les bruits environnants lorsque vous parlez à votre enfant (p.ex.: baisser le volume de la musique)